



## LA BIOSECURITE

# Stalosan®

Hygiene Solutions

### Un assainissant à sec unique

Son processus de production unique fait de **Stalosan®F** un produit sans égal pour améliorer l'hygiène de vos élevages.

**Stalosan®F** agit rapidement pour obtenir un cheptel hautement productif et en bonne santé.

Réduction de la mortalité

Efficacité prouvée sur les spores d'Aspergillus

Améliore les indices de consommation

Lutte contre la coccidiose, les ascarides et les poux rouges

Larvicide

#### LES RISQUES EN ELEVAGE

Humidité, ammoniac  
Spores d'Aspergillus  
Troubles respiratoires



#### LA REPONSE **Stalosan®F**

Environnement sain  
Ambiance maîtrisée  
Bien être animal assuré  
Production sécurisée

**Un atout pour votre biosécurité**

**Moins de frais**

**Meilleure rentabilité de l'élevage**

Nouvelle  
présentation  
en granulé



Sac de 25 kg  
ou Big-Bag de 500 kg



**AU QUOTIDIEN**  
**LE STALOSAN F**  
**POUDRE**  
**et GRANULE**



## LA BIOSECURITE

### PROGRAMME STALOSAN F EN VOLAILLE

<b>LE MAGASIN</b>	En pédiluve: Stalosan F poudre	Mettre à l'entrée de votre magasin dans le passage de porte , un pédiluve avec 5-6 cm de Stalosan F poudre afin de bien recouvrir la semelle des chaussures.
	Gel désinfectant	Pour chaque personne entrant dans votre poulailler: une application de gel sur vos mains afin de les désinfecter
<b>PREPARATION DE LA LITIERE</b>	Stalosan granulé: 250 à 500 g/m <sup>2</sup>	Avant l'arrivée des poussins, dindonneaux appliquer Stalosan granulé mélangé à la litière à raison de 250 à 500 g/m <sup>2</sup> .
<b>24 h AVANT ARRIVEE DES POUSSINS</b>	Stalosan F poudre: 50g/m <sup>2</sup>	Appliquer en surfacage 50g/m <sup>2</sup> de Stalosan F
<b>PENDANT LA PRODUCTION</b>	Stalosan F poudre: 50g/m <sup>2</sup> 1 fois par semaine	Appliquer Stalosan F en poudre en surfacage dans l'ensemble du poulailler, 50g/m <sup>2</sup>
<b>PERIODE DE STRESS</b>	Stalosan F poudre 50 g/m <sup>2</sup> 2 à 3 fois/ semaine	En période de stress (chaleur, pression microbienne élevée...) appliquer 2 à 3 fois par semaine en surfacage 50 g/m <sup>2</sup> Stalosan F.
<b>APRES CURAGE et DECAPAGE</b>	Stalosan F poudre 50g/m <sup>2</sup>	Après nettoyage du poulailler, avant le vide sanitaire appliquer 50 g/m <sup>2</sup> Stalosan F poudre pour assainir l'ensemble du poulailler .